

Patient Information

Insemination med partners sæd

- IUIH

Betingelser for behandlingen er:

Behandling med insemination af partners sæd forudsætter at æggelederen og livmoderen fungerer normalt, dvs.:

- At kvinden har ægløsning, uanset om den kommer af sig selv eller efter hormonbehandling.
- At kvinden har normal livmoder og fri passage i æggelederne.
- At kvinden er undersøgt for klamydia, celleforandringer og Røde Hunde.
- Der skal være mindst en millioner sædceller efter oprensning.
- At begge har fået taget blodprøver for hepatitis B og C samt HIV test i akkrediterede laboratorier




Illustration udlånt af Ferring

For at behandlingen skal lykkes er det vigtigt at æggeledere og livmoder fungerer normalt. Der skal være fri passage igennem æggelederne. Æggelederne skal kunne opsamle ægget efter ægløsningen, og de skal kunne transportere det befrugtede æg tilbage til livmoderen. Det skal være muligt for det befrugtede æg at sætte sig fast i livmoderen til videre udvikling.

På det rigtige tidspunkt lægges et blødt katheter i livmoderen med sædcellerne.

Behandlingen

Vores fremgangsmåde for insemination forbedrer chancerne for at der både er mindst ét godt æg og nok, bevægelige sædceller på det rigtige tidspunkt.

Vi giver en mild hormonstimulation med:

- Clomovid tabletter (Clomid, Pergotime®). Du skal tage to tabletter dagligt på dag tre til og med dag syv i din cyklus.
- Enkelte kvinder skal yderligere fra dag otte til og med dag tolv i cyklus have én injektion Puregon®/Gonal-F® om dagen.

Copenhagen Fertility Center

Lygten 2C 4. Sal 2400 København NV Tlf.: +45 33 25 70 00 E-mail: info@copenhagenfertilitycenter

En ISO9001:2008 certificeret klinik.

Version 1.0.14.godkend 20.2.10, Svl/Crax

Patient Information

Præparaterne får æg blæren til at vokse. Når æg blæren når en diameter på over 18 millimeter, fremkaldes ægløsning med en indsprøjtning af præparatet Ovitrelle®. Den næste dag foretager vi inseminationen, og vi gentager behandlingen dagen efter igen, hvis det er nødvendigt.

Behandlingens enkelte dage.

En af de første dage i menstruationscyklus ringer du til os og bestiller tid til en ultralydsscanning. Scanningen skal finde sted på din trettende cyklusdag. Vores telefonnummer er: 3325 7000.

Fra dag tre til syv i din cyklus (begge dage inklusive) skal du tage to Clomovid tabletter (Clomid, Pergotime®).

Fra ottende til tolvte cyklusdag (begge dage inklusive) skal du måske også, hvis lægen har ordineret dette, tage én ampul Puregon®/Gonal-f® om dagen.

På tolvte og trettende dag skal du udføre en ægløsningstest på morgenurin. Du får testen udleveret af os. Hvis ægløsningstesten er **positiv**, skal du ringe til os på telefon: 3325 7000. Du skal møde til insemination dagen efter. Er testen positiv foretager vi kun én insemination.

Hvis ægløsningstesten er **negativ**, møder du på Copenhagen Fertility Center, Fertilitetsklinikken, på din 13. cyklusdag til den tid vi aftaler. Her skal du scannes. Hvis scanningen viser mindst én æg blære over 18 millimeter og højst tre æg blærer over 17 millimeter, skal du tage en ægløsende indsprøjtning med Ovitrelle®.

Med hensyn til om man skal inseminere en eller to gange afhænger det af den kliniske situation. Er vi helt sikre på ægløsningstidspunktet er en insemination tilstrækkeligt. I de tilfælde hvor man er i tvivl (dette er få tilfælde) inseminere vi to dage i træk.

Bivirkninger og virkninger af medicinen

Virkning: Stimulerer æggestokkene og medfører, at de største æg blærer vokser videre og modner æggene, ligesom dele af medicinen virker æg løsende og støttende for livmoder slimhinden efter ægløsningen.

Pergotime:

Dosering: Normalt to tabletter = 100 milligram dagligt fra dag tre til og med dag syv i din cyklus. Hvis du er over 37 år skal du sandsynligvis tage tre tabletter dagligt = 150 milligram.

Bivirkninger: De fleste har ingen bivirkninger overhovedet. Enkelte oplever forbigående hedsure, kvalme, tågesyn og hovedpine.

Copenhagen Fertility Center

Lygten 2C 4. Sal 2400 København NV Tlf.: +45 33 25 70 00 E-mail: info@copenhagenfertilitycenter

Patient Information

Puregon:

Virkning: Stimulerer æggestokkene og medfører, at de største æg blærer vokser videre og modner æggene.

Bivirkninger: Ømhed, der hvor du er blevet stukket. Kan medføre overstimulation. Det kan dog kun ske ved højere doser.

Ovitrelle:

Virkning: Modner æggene det sidste stykke og fremkalder ægløsning.

Dosering: Én ampul = 5000 enheder. Indsprøjtes under huden, f.eks. nederst på maven.

Bivirkninger: Ingen af betydning. Kan i sjældne tilfælde medføre overstimulation

Lovgivningen

Alle par, der lever sammen og hvor begge kan skrive under som forældre kan behandles, når alderen for kvinden er under 45 år og det er medicinsk tilrådeligt at give denne behandling.

Udgifterne til behandlingen kan dækkes af Sygesikringen, men det er patientens eget ansvar at undersøge dette hos os.

Man kan også få støtte til behandling af det næste barn i familien.

Copenhagen Fertility Center

Lygten 2C 4. Sal 2400 København NV Tlf.: +45 33 25 70 00 E-mail: info@copenhagenfertilitycenter

En ISO9001:2008 certificeret klinik.

Version 1.0.14.godkend 20.2.10, Svl/Crax